

FASTMITE®

Etkili Madde: % 50 Bifenazate
Formülasyon Şekli: Suda Dağılılabilen Granül (WG)
Grubu: 20D AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı)



Ambalaj:
100g

A K A R İ S İ T



**KIRMIZIÖRÜMCEKLERİN
HER DÖNEMİNDE ETKİLİ ÇÖZÜM!**

Daha fazlası için

www.upl-ltd.com/tr



FASTMITE®

KIRMIZIÖRÜMCEKLERİN HER DÖNEMİNDE ETKİLİ ÇÖZÜM!

- FASTMITE® kontakt etkili bir akarisitir.
- Kırmızıörümceklerin nimf ve erginlerinde etkilidir.
- Uygulamadan 6 saat sonraki yağmur ve sulamadan etkilenmez.
- Entegre mücadele yöntemlerine uygundur.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 1-3 gündür.
- Mahsuller için tamamen güvenlidir.

ETKİ MEKANİZMASI

FASTMITE® içeriğindeki Bifenazate etken maddesi, kırmızıörümceklerin mitokondrilerinde elektron transferini engelleyerek enerji metabolizmalarını etkiler. Uygulamadan 3 saat sonra kırmızıörümceklerin aktiviteleri düşer, 3-7 gün içinde ölümler gerçekleşir.

KULLANMA ŞEKLİ

Domates - İki noktalı kırmızıörümcek

Rastgele seçilen bitkilerde, bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 20 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 3 canlı birey bulunduğu anda ilaçlama yapılır.




Patlıcan - İki noktalı kırmızıörümcek

Rastgele seçilen bitkilerde, bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu anda ilaçlama yapılır.

Pamuk - İki noktalı kırmızıörümcek

Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında veya içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlara ilaçlama yapılmalıdır. Tarla kenarından tarlanın içine yayılmış ve yapılan sayımlarda da yaprak başına Akdeniz Bölgesi'nde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet kırmızıörümceğe ulaşılmış ise kaplama ilaçlama yapılır. Son uygulama ve hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
 DOMATES (Sera)	İkinoktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	28 g/100 L su (Larva, Nimf, Ergin)	1 gün
 PATLICAN (Sera)	İkinoktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	28 g/100 L su (Larva, Nimf, Ergin)	1 gün
 PAMUK	İkinoktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	28 g/da (Larva, Nimf, Ergin)	3 gün

Ürün Geliştirme Müdürü
Burak Uğurer 0538 257 42 69

Ege Bölgesi Satış Temsilcisi
Cumhur Durgan 0538 057 34 06

İç Anadolu Bölgesi Satış Temsilcisi
Berat Palalı 0538 035 48 76

Ürün Geliştirme Müdürü
Erdal Eraydın 0532 131 10 13

Marmara Bölgesi Satış Temsilcisi
Ulaş Uysal 0538 035 51 04

Antalya Bölgesi Satış Temsilcisi
Mustafa Ali Tıgılı 0538 683 54 11

Ürün Geliştirme Müdürü
Murat Ergül 0533 573 23 80

Karadeniz Bölgesi Satış Temsilcisi
Ahmet Rasim Serdaroğlu 0538 257 59 71

GAP Bölgesi Satış Temsilcisi
Ramazan Sezer 0538 035 44 40

 @upturkey

 @upl.turkey



UPL Ziraat ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers No: 47B A Kule Kat: 31 D: 3107
35530 Bayraklı / İZMİR T: 0232. 446 57 89 - 90 F: 0232. 489 04 82 www.upl-ltd.com/tr

Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini okuyunuz.

Telif Hakkı © 2022 UPL. Tüm Hakları Saklıdır. FASTMITE®, UPL logo ve OpenAg™, United Phosphorus Limited şirketinin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

